



FICHA TÉCNICA

**Inductor de la
Floración**

**COGOLLADOR+
PK 13,5 – 14,5**



INTRODUCCIÓN

CANABIUM COGOLLADOR + PK 13,5 / 14,5 es un potente inductor de la floración y maduración en todo tipo de plantas de cannabis tanto de interior como de exterior. La mezcla de fosfato y potasio estimulan la floración y aumentan la producción de la planta, dando como resultado unos **cogollos de más peso, más prietos y más dulces**.

Sus componentes son fácilmente asimilables por la planta que rápidamente los utiliza para aumentar y mejorar la producción.

COMPOSICIÓN

ABONO CE PK 13.5-14.5.

Anhídrido Fosfórico (P₂O₅) total 13.5%; Anhídrido Fosfórico (P₂O₅) soluble en agua y citrato amónico neutro 13.5%.

Óxido de Potasio (K₂O) soluble en agua 14.5%.

PRESENTACIÓN

Líquido soluble (LS)

Se presenta en:
Botella de 500 ml.

PRINCIPALES APLICACIONES

COGOLLADOR+ se ha diseñado para la nutrición de las plantas de cannabis, tipo de plantas que, cuando son cultivadas, resultan ser exigentes en abonado para obtener de ellas las máximas sustancias de carácter medicinal o aromático.

Por su composición El Cogollador+ CANABIUM está indicado para su utilización durante la fase de **floración**, en el que este tipo de plantas necesitan:

- una cantidad importante de fósforo (P) esencial para la producción de energía en la planta con la que llevar a cabo todos sus procesos metabólicos.
- una cantidad importante de potasio (K) para el desarrollo



de una potente floración y fructificación. Además, en plantas cultivadas en situaciones de luminosidad limitada las necesidades de potasio son más elevadas.

MODO DE EMPLEO-DOSIFICACION

Calendario de aplicación:

- A principios de la floración aplicar una sola vez por vía foliar. Disolver 2,5 ml en 10l de agua.
- A partir de la tercera semana de la floración aplicar el cogollador+ en agua de riego 2/3 veces por semana. Disolver 2,5 ml de Cogollador+ en 10l de agua de riego aumentando la dosis progresivamente hasta un máximo de 30 ml.:

Semana 3: 2,5 ml/10l

Semana 4: 5 ml/10l

Semana 5: 10 ml/10l

Semana 6: 15 ml/10l

Semana 7: 20 ml/10l

Semana 8: 30ml/10l

- **Una semana antes de la cosecha regar solo con agua.**

AGITAR ANTES DE USAR

Abonar siempre con el sustrato húmedo. Regar siempre por encima de la maceta cuando se aporte fertilizante, procurando que no llegue a escurrir agua por debajo de la maceta. No abonar durante las horas de máxima insolación.

No almacenar a temperaturas inferiores a 5° C

Mantener lejos del alcance de los niños – Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos